
















LES INSECTES DU PECHEUR À LA MOUCHE BRETON

EPHÉMÉROPTÈRES EN BRETAGNE: PRÈS DE 50 ESPÈCES RÉPARTIES EN 7 FAMILLES ET 14 GENRES
EPHÉMÈRES LES PLUS COURANTS EN BRETAGNE NORD OCCIDENTALE
 (PAR ORDRE DE FRÉQUENCE DÉCROISSANTE)

Genre	Espèce	Période d'émergence	Longueur du corps	Silhouette
Baetis	<i>rhodani vernus</i>	Toute la saison	7 à 10 mm	
Serratella	<i>ignita</i>	À partir de juin	6 à 10 mm	
Ephemera	<i>danica</i>	Mai à juillet	16 à 25 mm	
Echyonurus	<i>venosus</i>	Printemps (eaux vives)	12 à 20 mm	
Caenis	<i>luctuosa</i>	Été (matin)	4 à 4,5 mm	
Rhithrogena	<i>semicolorata</i>	Printemps & début été (eaux vives)	9 à 12 mm	
Habrophlebia	<i>lauta</i>	Été (soir)	6 à 8 mm	
Baetis	<i>fuscatus scambus</i>	Juin à septembre	5,5 à 8 mm	
Cloeon	<i>dipterum</i>	Toute l'année	7 à 10 mm	
Nigrobaetis	<i>niger</i>	Début et fin de saison	5 à 8 mm	
Epeorus	<i>torrentium</i>	Printemps (eaux vives)	16 à 20 mm	
Habroleptoides	<i>confusa</i>	Printemps	8 à 9 mm	
Heptagenia	<i>sulphurea</i>	Mai à septembre	8 à 12 mm	
Centroptilum	<i>luteolum</i>	Toute l'année	5 à 8 mm	
Alainites	<i>muticus</i>	Printemps et fin de saison	4,5 à 7 mm	
Paraleptophlebia	<i>Submarginata cincta</i>	Mai & juin	9 à 12 mm	