




LES INSECTES DU PECHEUR À LA MOUCHE BRETON

PLECOPTERES EN BRETAGNE : 30 ESPECES REPARTIES 7 FAMILLES ET 14 GENRES

PLECOPTERES LES PLUS COURANTS EN BRETAGNE NORD OCCIDENTALE

(PAR ORDRE DE FRÉQUENCE DÉCROISSANTE)

| Genre | Espèce | • Couleur • Époque d'émergence | Taille insecte adulte (hors antennes) | Silhouette |
|--------------|---------------------|---|---|---|
| Protonemura | <i>meyeri</i> | • Jaune • Avril à juin | Petit 5 à 8 mm |  |
| Leuctra | <i>fusca</i> | • Brun cuivre • À partir de mi-août | Moyen 8 à 11 mm |  |
| Isoperla | <i>grammatica</i> | • Jaune souffre • Automne | Moyen 8 à 13 mm |  |
| Siphonoperla | <i>torrentium</i> | • Jaunâtre • Mars & avril | Petit 5 à 9 mm |  |
| Leuctra | <i>geniculata</i> | • Brun • Mi-juillet à fin de saison | Moyen 8 à 11 mm |  |
| Dinocras | <i>cephalotes</i> | • Brun gris • Mi-avril à août | Gros 15 à 24 mm |  |
| Perlodes | <i>microcephala</i> | • Brun • Avril | Gros 12 à 22 mm |  |
| Protonemura | <i>intricata</i> | • Brun foncé • Précoce, début de saison | Moyen 7 à 9 mm |  |
| Brachyptera | <i>risi</i> | • Brun • Mi-mars à juillet | Moyen 7 à 10 mm |  |
| Leuctra | <i>hippopus</i> | • Jaune • Mi-février à mai | Petit 5 à 9 mm |  |
| Taeniopteryx | <i>schoenemundi</i> | • Brun clair • Février & mars | Moyen 7 à 11 mm |  |
| Nemoura | <i>cinerea</i> | • Brun • Avril à septembre | Petit 6 à 9 mm |  |
| Nemurella | <i>picteti</i> | • Brun • Avril à septembre | Petit 6 à 9 mm |  |