













LES INSECTES DU PECHEUR À LA MOUCHE BRETON

TRICHOPTERES EN BRETAGNE: 110 ESPECES REPARTIES EN 19 FAMILLES ET 54 GENRES

TRICHOPTERES LES PLUS COURANTS EN BRETAGNE NORD OCCIDENTALE

(PAR ORDRE DE FRÉQUENCE DÉCROISSANTE)

Genre	Espèce	• Couleur • Époque d'émergence	Taille insecte adulte (hors antennes)	Silhouette
Rhyacophila	<i>dorsalis</i>	• Marron à grisâtre, avec abdomen parfois vert • Avril à fin de saison	10 à 14 mm	
Polycentropus	<i>flavomaculatus</i>	• Grisâtre, ailes tachetées • Avril à fin de saison	7 à 12 mm	
Wormaldia	<i>occipitalis</i>	• Gris • Mi-avril à fin de saison	10 mm	
Agatepus	<i>fuscipes</i>	• Noir • Mai à septembre	10 mm	
Micrasema	<i>longulum</i>	• Noir • Printemps au début de l'été	10 mm	
Micrasema	<i>setiferum</i>	• Noir • Printemps au début de l'été	10 mm	
Brachycentrus	<i>subnubilus</i>	• Gris • Avril à juillet	8 à 11 mm	
Odontocerum	<i>albicorne</i>	• Gris argenté • Mai à septembre	30 mm	
Hydropsyche	<i>sitalai</i>	• Gris • Mai à octobre	20 mm	
Tinodes	<i>waeneri</i>	• Gris • Mai à octobre	10 mm	
Sericostoma	<i>personatum</i>	• Marron foncé • Mi-mai à fin septembre	11 à 14 mm	
Halesus	<i>radiatus</i>	• Brun • Août à fin de saison	20 à 22 mm	
Lasiocephala	<i>basalis</i>	• Brun • Mi-mai à août	20 mm	